



**Cortiment**<sup>®</sup>  
budesonid

**FERRING**  
PHARMACEUTICALS


# PATIENTINFORMATION TILL DIG SOM BEHANDLAS MED CORTIMENT<sup>®</sup>

Broschyren är framtagen i samarbete med IBD-sjuksköterskor.

## VAD ÄR CORTIMENT<sup>1</sup>?


Cortiment innehåller budesonid. Budesonid tillhör en grupp av läkemedel som kallas kortison. Dessa används för att minska inflammation. Cortiment skiljer sig från andra kortisonpreparat eftersom de olika lagren i tablettens gör att den löses upp först när den kommer ner i tarmen. Det gör att Cortiment har en lokal antiinflammatorisk effekt i tjocktarmen och därmed en liten påverkan på övriga delar av kroppen.

Cortiment används för behandling av inflammation i tjocktarmen (kolon) och ändtarmen (rektum) hos vuxna.



### CORTIMENT – tablettens uppbyggnad

Cortiment är uppbyggd av flera lager för att frisättningen av den aktiva substansen ska ske i kolon (tjocktarmen) och där ge den antiinflammatoriska effekten.



- Lager som skyddar den aktiva substansen från att brytas ner i magsäcken och tunntarmen.
- Vattenlöslig fyllnad
- Fettlösligt, vattenavstötande lager som hindrar tarmvätskor från att komma in i tablettkärnan.
- Aktiv substans + hjälpämnen

### MÅL MED BEHANDLING AV UC (ULCERÖS KOLIT)<sup>2</sup>:

- Induktion och bibehållande av remission
- Slemhinneläkning i tarmen
- Undvikande av kirurgiska ingrepp
- Minskning av cancerrisk i kolon
- Ökning av livskvalitet





## VARFÖR HAR DU FÅTT CORTIMENT?

Cortiment används som behandling av inflammation i kolon (tjocktarm) och ändtarm hos vuxna.

## HUR BÖR DU ANVÄNDA CORTIMENT?

Du ska alltid ta Cortiment efter din läkares anvisningar.

- Rekommenderad dos är 1 tablett (9 mg) om dagen, tas på morgonen före eller till frukost.
- Svälj tablett hel med ett glas vatten. Tablett får inte delas, krossas eller tuggas.
- Vanligen tas Cortiment dagligen upp till 8 veckor. (Din läkare kommer att ge dig anvisningar om hur du avslutar eller trappar ner behandlingen). Fortsätt med behandlingen enligt läkares rekommendationer, även om du börjar må bättre.
- Sluta inte att ta Cortiment utan att rådfråga din läkare. Om du plötsligt avbryter behandlingen kan du börja må dåligt.
- Det kan ta tid innan du märker symtomlindring med Cortiment, men för att uppnå full behandlingseffekt är det viktigt att du fullföljer behandlingen enligt läkares ordination.
- Om man för övrigt mår bra kan man träna som vanligt när man tar Cortiment.



## VIKTIGT ATT VETA INNAN DU BÖRJAR BEHANDLING MED CORTIMENT

Ta inte Cortiment om du är allergisk mot budesonid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (se bipacksedeln).

**OBS:** Cortiment innehåller lecitin som kommer från sojaolja. Om du är allergisk mot jordnötter eller soja ska du inte använda detta läkemedel. Cortiment innehåller laktos.

**Tala med din läkare om du är allergisk eller överkänslig mot dessa ämnen!**

## EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Cortiment orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Systemiska biverkningar som är typiska för kortisonpreparat (t ex acne, viktuppgång och sömnpåverkan) kan förekomma med Cortiment men inte i samma utsträckning som med de traditionellt använda preparat som inte har den lokala effekten som Cortiment har.

I studier var antalet biverkningar med Cortiment tablett, vid rekommenderad dos, 9 mg dagligen, jämförbart med placebo (sockerpiller). De flesta biverkningar hade lindrig till måttlig intensitet och var inte allvarliga. Se potentiella biverkningar i bipacksedeln som medföljer läkemedelsförpackningen.

Om du får en allergisk reaktion ska du genast kontakta läkare. Symtom på detta kan vara nässelfeber eller svullnad i ansikte, läppar, mun, tunga eller strupe. Andningssvårigheter kan också förekomma.

Om du får biverkningar, tala med din läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i bipacksedeln.



## VARNING OCH FÖRSIKTIGHET

- om du har en infektion såsom virus-, bakterie- eller svampinfektion
- om du har haft högt blodtryck
- om du har diabetes
- om du har haft benskörhet
- om du har haft magsår
- om du har haft ökat tryck i ögat (glaukom) eller grå starr
- om någon i din nära släkt har haft diabetes eller ökat tryck i ögat (glaukom)
- om du har haft leverproblem
- om du byter från annan kortisonbehandling till Cortiment eftersom detta kan resultera i t ex smärta i muskler och leder, trötthet, huvudvärk, illamående och kräkningar
- om du vet att du behöver vaccineras
- om du har behandlats med ett starkare kortisonpreparat före behandling med Cortiment kan dina symtom återkomma
- om du får en infektion under behandlingen kan Cortiment dölja tecken på infektion och infektionen kan bli värre. Du kan lättare få infektioner under behandlingen med Cortiment eftersom kroppens motståndskraft mot infektioner kan minska.
- om du ska genomgå en operation inom snar framtid eller genomgår en stressig period
- om du ännu inte har haft mässling eller vattkoppor. Försök att undvika personer som har mässling eller vattkoppor medan du tar Cortiment tabletter. Tala med läkare om du tror att du har blivit smittad med vattkoppor eller mässling medan du tar detta läkemedel.

Att ta kortisonpreparat i höga doser och under en längre period kan påverka alla delar av kroppen och i mycket sällsynta fall orsaka psykiska besvär.

Om du inte är säker på om något av ovanstående gäller dig, tala med läkare innan du tar Cortiment.

Om du får något av tillstånden ovan under pågående behandling med Cortiment ska du rådfråga din läkare innan du slutar ta läkemedlet. Avsluta inte på egen hand.

## CORTIMENT TILLSAMMANS MED ANDRA LÄKEMEDEL, MAT OCH DRYCK

Tar du andra läkemedel ska du berätta det för din läkare eftersom effekten av Cortiment kan påverkas.

Drick inte grapefruktjuice när du tar Cortiment, det kan påverka det sätt på vilket läkemedlet verkar.

## CORTIMENT VID GRAVIDITET, AMNING OCH OPERATION

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller sjuksköterska innan du använder detta läkemedel. Om du ska genomgå en operation inom snar framtid eller är mycket stressad kan läkaren justera din kortisondos. Rådfråga alltid din läkare!

## OM DU TAGIT FÖR MYCKET CORTIMENT

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

## OM DU GLÖMT ATT TA CORTIMENT

Om du glömmet att ta en dos av Cortiment, ta den så fort du kommer ihåg. Om det snart är dags för nästa dos, hoppa då över den missade dosen.

Ta inte dubbel dos (två doser på samma gång) för att kompensera för glömd dos.

## HUR FÖRVARAR JAG CORTIMENT?

Förvara Cortiment utom syn- och räckhåll för barn. Tablettförpackningen förvaras vid högst 30° C.

Kasta aldrig Cortiment i toaletten eller bland hushållsavfall. Om du skulle få Cortiment-tabletter över efter avslutad behandling lämnas de in på apoteket.

## Inflammatorisktarm.nu

HEMSIDAN DÄR DU HITTAR DET DU BEHÖVER VETA OM IBD

Läs mer om din sjukdom på [inflammatorisktarm.nu](http://inflammatorisktarm.nu)



CORTIMENT (budesonid). Indikation: Cortiment är indicerat för induktion av remission hos vuxna patienter med lindrig till måttlig aktiv ulcerös kolit där 5-ASA behandling haft otillräcklig effekt. Beredningsform: Depottablett, 9 mg, Rx (F). Begränsningar: Subventionernas endast för patienter som av biverkningskäl inte är lämpliga för behandling med oralt prednisolon och inte kan behandlas med enbart rektalt budesonid. ATC-kod: A07EA06. SPC uppdaterad: 2017-07-27.

För ytterligare information och senaste prisuppgift, se [www.fass.se](http://www.fass.se)

#### REFERENSER:

1. [www.fass.se](http://www.fass.se)
2. Siew N, Kamm MA. Therapeutic strategies for the management of ulcerative colitis. Inflamm Bowel Dis. 2009;15:935-50.

**FERRING**

PHARMACEUTICALS

Ferring Läkemedel AB, Box 4041, 203 11 Malmö, Tel: 040-691 69 00, [www.ferring.se](http://www.ferring.se)